


¿CÓMO SE DEBE USAR LA TERAPIA COMPRESIVA?



LO IDEAL ES AJUSTAR LA TERAPIA COMPRESIVA EN «DOSIS QUE VARÍEN DE LIGERA A FUERTE» SEGÚN LAS NECESIDADES CONCRETAS DEL PACIENTE. NO OBSTANTE,



A. DEBES USAR AL MENOS TERAPIA COMPRESIVA LIGERA (20 MM HG) EN CUALQUIER HERIDA DE UNA EXTREMIDAD INFERIOR SI EL PACIENTE NO SUFRE ISQUEMIA GRAVE NI INSUFICIENCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA GRAVE.




B. PUEDES USAR TERAPIA COMPRESIVA FUERTE EN LA MAYORÍA DE LOS PACIENTES CON ÚLCERAS EN LAS PIERNAS. LOS DATOS MUESTRAN QUE LA COMPRESIÓN FUERTE TIENE BENEFICIOS ADICIONALES, COMO EL AUMENTO DE LAS PROPIEDADES CICATRIZANTES Y LA DETENCIÓN DEL EXUDADO.



SI TIENES DUDAS SOBRE EL USO DE LA TERAPIA COMPRESIVA, DEBES CONSULTAR O DIRIGIRTE A UN CENTRO ESPECIALIZADO PARA QUE SE HAGA UN DIAGNÓSTICO PRECISO Y UN PLAN DE TRATAMIENTO ADECUADO. LAS DUDAS PUEDEN SURGIR SI:

1. NO ESTÁS SEGURO/A DE SI EXISTEN FACTORES DE RIESGO QUE CONTRAINDIQUEN EL USO DE LA TERAPIA COMPRESIVA, COMO ISQUEMIA O INSUFICIENCIA CARDÍACA GRAVES.



2. LA HERIDA TIENE CARACTERÍSTICAS ATÍPICAS (POR EJEMPLO, ASPECTO ANORMAL, VARIAS ÚLCERAS O DOLOR INTENSO)



3. LA HERIDA NO MUESTRA UNA REDUCCIÓN DEL 30-40 % EN UN MES CON COMPRESIÓN ADECUADA.

TERAPIA COMPRESIVA: POR QUÉ ES NECESARIO HACERLO BIEN



LA TERAPIA COMPRESIVA TIENE LA CAPACIDAD DE CICATRIZAR LAS HERIDAS: ES UN PILAR FUNDAMENTAL EN EL TRATAMIENTO DE LA MAYOR PARTE DE LAS ÚLCERAS DE PIERNA, ALGO QUE CORROBORAN NUMEROSOS ESTUDIOS Y GUÍAS CLÍNICAS.



CON LA TERAPIA COMPRESIVA ES POSIBLE:

- ✓ AUMENTAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA EN LAS PIERNAS
- ✓ MEJORAR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA AL CORAZÓN
- ✓ REFORZAR LAS VENAS
- ✓ REDUCIR LA HINCHAZÓN




LA TERAPIA COMPRESIVA TIENE NUMEROSOS BENEFICIOS



TERAPIA COMPRESSIVA PER LE FERITE CHIRURGICHE DELL'ARTO INFERIORE



LA TERAPIA COMPRESSIVA HA IL POTERE DI FAVORIRE LA GUARIGIONE DELLE FERITE: È UNA PIETRA MILIARE NEL TRATTAMENTO DELLE FERITE DELL'ARTO INFERIORE, COMPRESI LE FERITE CHIRURGICHE, E LE SUTURE E NELLA CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA CON LEMBO



SENZA TERAPIA COMPRESSIVA, MOLTE SUTURE POTREBBERO EVOLVERE IN DEISCENZE A CAUSA DELLA PRESENZA DI EDEMA. QUESTO PROVOCA INFEZIONI RIPETUTE E LENTA GUARIGIONE DELLA FERITA. LA GESTIONE DELL'EDEMA È ESSENZIALE DOPO LA CHIRURGIA PER:

- EDEMA CONDIZIONATO DALLA RIDUZIONE DELLA MOBILITÀ E QUINDI DAL RITORNO VENOSO
- DANNO AI LINFATICI LOCALI DURANTE L'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE CON LEMBI
- PRELIEVO VENOSO PER UN INNESTO DI BYPASS
- GESTIONE DELL'EDEMA A SEGUITO DI AMPUTAZIONE SOTTO IL GINOCCHIO E RICOSTRUZIONE DEL MONCONE

APPLICANDO LA GIUSTA COMPRESSIONE SI PREVENGONO DANNI AL PAZIENTE E SI RIDUCONO I COSTI ED I TEMPI ASSOCIATI AL TRATTAMENTO



CON LA TERAPIA COMPRESSIVA
È POSSIBILE:

- ✓ RIDURRE LE COMPLICANZE CHIRURGICHE DOPO GLI INTERVENTI ALL'ANCA ED ALLA GAMBA
- ✓ RIDURRE L'EDEMA E LE DEISCENZE DELLE FERITE CHIRURGICHE
- ✓ SOSTENERE IL SISTEMA LINFATICO FAVORENDO LA GUARIGIONE
- ✓ RIDUCE DOLORE ED INFEZIONE



CON LA TERAPIA COMPRESSIVA È POSSIBILE OTTENERE BENEFICI

MULTIFUNZIONALI:

- RIDUCE L'INFEZIONE DEL SITO CHIRURGICO
- HA PROPRIETÀ ANTINFIAMMATORIE
- RIDUCE IL DOLORE E L'ESSUDAZIONE
- RIDUCE I PROBLEMI DELLA CUTE E L'EDEMA
- RIDUCE IL TEMPO DI GUARIGIONE E LE RECIDIVE

BENEFICI

BUONI RISULTATI PER IL PAZIENTE:

- NE MIGLIORA LA VITA
- CONSENTE AI PAZIENTI DI IMPEGNARSI NELLA GUARIGIONE DELLE LORO FERITE
- FACILMENTE ADATTABILE
- BEN TOLLERATO

IMPIEGO:

- DI SEMPLICE UTILIZZO
- FA UNA GRANDE DIFFERENZA